


## Önemli Erik Çeşitleri

Önemli Not: Bu belgede kullanılan resimlerin her türlü yayın hakkı Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsüne ait olup, hiçbir şekilde başka bir eserde kullanılamaz...

**OBILNAJA**

<b>Orijini</b>	Rusya Kırım
<b>Ağacı</b>	Yayvan, kuvvetli gelişim
<b>Meyvesi</b>	Orta-ili yuvarlak, karn çizgili belirgin ve meyve lopları asimetrik
<b>Meyve kabuğu</b>	Yeşil zemin üzerine parçalı morumsu kırmızı renkte
<b>Meyve eti</b>	Sarı-turuncu renkte, ılı sulu, çekirdeğe tam bağlı
<b>Derim</b>	Temmuzun 1-2. haftası, meyveler tek seferde hasat olumuna gelmez
<b>Tozlayıcılar</b>	Shiro, Morettini 355
<b>Diğer Özellikler</b>	Hızlı gelişim, erken ve bol meyve verir. Meyve kalitesi çok yüksek olmasına rağmen Japon gurubu içerisinde erken hasada gelmesinden dolayı 3. ve 4. çıkar.

5



6

## OZARK PREMIER

<b>Orijini</b>	Kuvvetli, yayvan
<b>Ağacı</b>	İli, loplun asimetrik, yumurta şeklinde
<b>Meyvesi</b>	Açık yeşil zemin üzerine parçalı pembe sarı renkte ve pusu
<b>Meyve kabuğu</b>	Sarımsı açık yeşil renkte, lifli sulu, çekirdeğe tam bağlı, tatlı ve dokusu sıkı
<b>Meyve eli</b>	Temmuzun 3-4 haftası
<b>Derim</b>	Sanlarosa, Formosa
<b>Tozlayıcılar</b>	Meyve kalitesi yüksek ve bol verimli sofralık bir çeşittir.



## BLACK BEAUTY

<b>Orijini</b>	Kaliforniya
<b>Ağacı</b>	Kuvvetli, orta dik
<b>Meyvesi</b>	Yuvarlak, orta irilikte, meyve lopsan simetrik
<b>Meyve kabuğu</b>	Yeşil mor zemin üzerine siyah
<b>Meyve eti</b>	Koyu yeşil-sarı renkte, meyve eti çekirdeğe tam bağlı
<b>Derim</b>	Ağustosun 1-2. haftası
<b>Tozlayıcılar</b>	Santa Rosa
<b>Diğer Özellikler</b>	Orta verimli, aromalı



9



## ANGELENO

<b>Orijini</b>	Kaliforniya
<b>Ağacı</b>	Orta kuvvette, yan dik
<b>Meyvesi</b>	Orta iri, yuvarlak, meyve lopları asimetrik karni çizgili belirgin ve çiçek çukuru sıvri
<b>Meyve kabuğu</b>	Patlıcan moru siyaha yakın renkte, üzeri puzlu
<b>Meyve eti</b>	Yeşil sarı renkte, çekirdek küçük ve meyve etine bağlı, dokusu sıkı
<b>Derim</b>	Eylülün 4.- Ekim'in 1. haftası
<b>Tazlayıcılar</b>	Friar ve Formosa
<b>Diğer Özellikler</b>	Geç dönemde hasat edilmesi, depoda dayanım süresinin 3 aydan fazla olması pazar değerini artırmaktadır.






22


## PAPAZ


<b>Orijini</b>	Anadolu
<b>Ağacı</b>	orta dik, kuvvetli gelişim
<b>Meyvesi</b>	Yuvarlak, küçük, ortalama 10-16g, kam çizgili belirgin, meyve lopları simetrik
<b>Meyve kabuğu</b>	Yeşil sarı zemin üzerine yeşil renkte ve ince
<b>Meyve eli</b>	Sulu, lifli, çekirdeğe tam bağlı ve ekşi
<b>Derim</b>	Haziranın ilk haftası
<b>Taslayıcılar</b>	Ankara, Havran
<b>Diğer Özellikler</b>	Özellikle erkenci turlarda bölgeleri için uygun, verimli



## STANLEY

<b>Orijini</b>	Amerika
<b>Ağacı</b>	Orta kuvvette, yan dik
<b>Meyvesi</b>	Küçük, karnı çizgisi belirgin ve meyve lopları asimetrik
<b>Meyve kabuğu</b>	Yeşil zemin üzerine patlıcan moru renkte ve üzeri püslü
<b>Meyve eti</b>	Çekirdeğe az bağlı, ince, lifli ve sarı renkte
<b>Derim</b>	Ağustosun 4.- Eylülün 1. haftası
<b>Taslayıcılar</b>	Kendine verimli
<b>Diğer Özellikler</b>	Sofralık ve kurutmalık, bol verimli bir çeşittir. Halk arasında bir ton adı ile bilinir.





## PRESIDENT

<b>Orijini</b>	İngiltere
<b>Ağacı</b>	Dik ve yan kuvvetli gelişim
<b>Meyvesi</b>	Orta il-ül, uzun elips şeklinde, meyve lopları asimetrik
<b>Meyve kabuğu</b>	Yeşil sarı zemin üzerine parçalı parlak mor renkte
<b>Meyve eti</b>	Ulfi, sulu ve çekirdeğe az bağlı
<b>Derim</b>	Eylülün 1-2. haftası
<b>Tozlayıcılar</b>	Kendine verimli
<b>Diğer Özellikler</b>	Sofralık ve kurutmalık bir çeşittir. 2 aya kadar depoda muhafaza edilebilir.

